

На правах рукописи

Гильмутдинова Альбина Фаритовна

**ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
С ФЕНОМЕНОМ НЕЕДИНСТВЕННОСТИ**

05.13.18 – математическое моделирование, численные  
методы и комплексы программ

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата физико-математических наук

**ЧЕЛЯБИНСК – 2009**

Работа выполнена в Южно-Уральском государственном университете.

**Научный руководитель:**

доктор физико-математических наук,  
профессор Свиридюк Георгий Анатольевич

**Официальные оппоненты:**

доктор физико-математических наук,  
профессор Кадченко Сергей Иванович  
доктор физико-математических наук,  
доцент Сукачева Тамара Геннадьевна

**Ведущая организация:**

Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова

Защита состоится 11 февраля 2009 года в 10.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.298.14 при Южно-Уральском государственном университете, по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76, ауд. 1001.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Южно-Уральского государственного университета.

Автореферат разослан 31 декабря 2008 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
доктор физ.-мат. наук, профессор

Л. Б. Соколинский

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Цели и задачи работы.** Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$  – ограниченная область с границей  $\partial\Omega$  класса  $C^\infty$ . В области  $\Omega \times \mathbb{R}$  рассмотрим начально-краевую задачу

$$(\lambda - \nabla^2)(u(x, 0) - u_0(x)) = 0, \quad x \in \Omega; \quad (1)$$

$$u(x, t) = 0, \quad (x, t) \in \partial\Omega \times \mathbb{R}; \quad (2)$$

для уравнения Корпусова – Плетнера – Свешникова (КПС)

$$(\lambda - \nabla^2)u_t = \alpha \nabla^2 u + \beta(\nabla, u \nabla u). \quad (3)$$

В цилиндре  $\Omega \times \mathbb{R}_+$  рассмотрим начально-краевую задачу

$$v(x, 0) = v_0(x), \quad x \in \Omega; \quad (4)$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial n} + \lambda v\right)(x, t) = \left(\frac{\partial w}{\partial n} + \lambda w\right)(x, t) = 0, \quad (x, t) \in \partial\Omega \times \mathbb{R}_+; \quad (5)$$

для системы уравнений Плотникова

$$v_t = \Delta v - \Delta w, \quad 0 = v + \Delta w + \delta w - \beta w^3. \quad (6)$$

Уравнение (3) моделирует метастабильные процессы в жидком двухкомпонентном полупроводнике. Параметры  $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{R}$  характеризуют свойства полупроводника, причем квазистационарные процессы в полупроводниках возможны только при условии отрицательности коэффициента  $\lambda$ . Именно в данном случае возможен пробой полупроводника, наблюдаемый экспериментально. Впервые уравнение (3) было получено в работе М.О. Корпусова, Ю.Д. Плетнера, А.Г. Свешникова<sup>1</sup>. Здесь же была установлена однозначная разрешимость задачи (1)-(3) только в случае положительности параметра

---

<sup>1</sup>Корпусов, М. О. О квазистационарных процессах в проводящих средах без дисперсии /Корпусов М.О., Плетнер Ю.Д., Свешников А.Г.// ЖВМиМФ.– 2000.– Т. 4, в8.– С. 1237-1249.

$\lambda$ , что влечет обратимость дифференциального оператора при производной по времени в уравнении КПС. Нашей **целью** является качественное и численное исследование данной начально-краевой задачи при любых (в том числе и отрицательных) значениях параметра  $\lambda$ .

Система уравнений (6) представляет один из вариантов модели фазового поля в рамках мезоскопической теории в предположении, что время релаксации равно нулю. Параметры  $\beta$  и  $\delta$  характеризуют фазовый переход. Содержание и знак параметра  $\beta \in \mathbb{R}$  в дальнейшем несущественны, главное, что  $\beta \neq 0$ . Систему уравнений (6) впервые построил, глубоко и обстоятельно изучал П.И. Плотников с учениками<sup>2</sup>. В цитированных работах установлено существование решения задачи (4)-(6), и поставлен вопрос о его единственности. Нашей **целью** является качественное и численное исследование разрешимости задачи (4)-(6) и единственности ее решения при различных значениях параметра  $\delta$ . Для достижения поставленных целей необходимо было решить следующие **задачи**. Первая – исследовать морфологию фазовых пространств задач (1)-(3), (4)-(6). Вторая – получить условия неединственности решений поставленных задач. Третья – провести численные эксперименты, иллюстрирующие феномен неединственности решений данных задач.

Качественное исследование задач (1)-(3) и (4)-(6) облегчается тем обстоятельством, что они обе в подходящем образом подобранных банаховых пространствах  $\mathcal{M}$  и  $\mathcal{X}$  редуцируются к задаче Шоултера – Сидорова

$$L(u(0) - u_0) = 0, \quad (7)$$

для полулинейного уравнения соболевского типа

$$L\dot{u} = Mu + N(u). \quad (8)$$

---

<sup>2</sup>Плотников П. И. Задача Стефана с поверхностным натяжением как предел модели фазового поля / П. И. Плотников, В. Н. Старовойтов // Дифференц. уравнения. – 1993. – Т. 29, № 3. – С. 461-471.

Плотников П. И. Уравнения фазового поля и градиентные потоки маргинальных функций / П. И. Плотников, А. В. Клепачева // Сиб. матем. журн. – 2001. – Т. 42, № 3. – С. 651-669.

**Актуальность темы.** Впервые уравнения, не разрешенные относительно старшей производной, появились в работе А. Пуанкаре в 1885 году. Первым, кто начал систематическое изучение начально-краевых задач для линейных уравнений вида (8), где  $L$  и  $M$  (возможно, матричные) дифференциальные операторы в частных производных по "пространственным" переменным, а оператор  $N = \mathbb{O}$ , был С. Л. Соболев в 40-х годах прошлого столетия. С тех пор возникла традиция уравнения вида (8) и конкретные их интерпретации вида (3), (6) называть *уравнениями соболевского типа*. В настоящее время теория уравнений соболевского типа переживает пору бурного расцвета. В этой области активно работают Р.Е. Шоултер, Г.В. Демиденко, С.В. Успенский, Н.В. Сидоров, Ю.Е. Бояринцев, В.Ф. Чистяков, И.В. Мельникова, Г.А. Свиридюк, В.Е. Федоров и многие другие. Данная диссертационная работа выполнена в рамках направления, возглавляемого Г.А. Свиридюком.

**Методы исследования.** Основным методом исследования полулинейных уравнений соболевского типа в данной диссертации служит метод фазового пространства, предложенный Г. А. Свиридюком и Т. Г. Сукачевой. Вкратце суть этого метода заключается в редукции уравнения (8), где, возможно,  $\ker L \neq \{0\}$ , к регулярному уравнению

$$\dot{u} = Su + F(u), \tag{9}$$

определенному, однако, не на всем пространстве  $\mathcal{U}$ , а только на некотором его подмножестве, понимаемом как *фазовое пространство уравнения* (8). Применяв описанный выше метод *фазового пространства* к моделям (3) и (6), нам удалось установить неединственность решения задачи (7), (8). Кроме метода фазового пространства мы широко используем теорию линейных уравнений соболевского типа и порождаемых ими вырожденных групп и полугрупп операторов; теорему о неявной функции и теорему Вишика – Минти – Браудера; теорему Коши как для случая векторных полей на банаховых многообразиях, так и для случая полулинейных эволюционных уравнений в банаховых пространствах. И, наконец, красной нитью через всю диссертацию проходит идеология теории особенностей Уитни. Поскольку дис-

сертация кроме качественных исследований содержит еще и результаты численных экспериментов, подтверждающих феномен неединственности решения моделей (3) и (6), необходимо отметить метод Галеркина, лежащий в основе наших экспериментов.

**Научная новизна.** Все результаты, выносимую на защиту, являются новыми и получены автором лично. Достоверность полученных результатов обеспечена полными доказательствами всех утверждений, причем математическая строгость доказательств соответствует современному уровню. Обоснованность научных положений и выводов, сформулированных в диссертации, подкрепляется разработкой программ, основанных на подходе, предлагаемом автором.

**Теоретическая значимость.** Основное содержание диссертации – качественное исследование морфологии фазовых пространств уравнения Корпусова – Плетнера – Свешникова и системы уравнений Плотникова. Впервые обнаружено, что фазовые пространства (при некоторых критических значениях параметров) расположены на многообразиях, имеющих особенности – складку и сборку Уитни соответственно. Установлена связь между наличием особенностей и единственностью решений физически осмысленной задачи Шоултера – Сидорова, т.е. отмечены области начальных данных, при которых задача имеет одно, два или три решения.

**Практическая значимость.** Практическая же значимость заключается в том, что данные результаты учитываются при проведении численных экспериментов. Впервые разработаны алгоритмы численного решения задач (1)-(3), (4)-(6), получены графические изображения этих решений. Построенные алгоритмы реализованы в вычислительной среде Maple 12.0. Результаты диссертации могут быть использованы в исследованиях, проводимых по данной тематике.

**Апробация работы.** Результаты, изложенные в диссертации были представлены на Воронежской зимней математической школе "Современные методы теории функций и смежные проблемы" (Воронеж, 2005), студенческой конференции ЧелГУ в 2005 году (г. Челябинск), Всероссийской научной конференции "Математика. Механика. Ин-

форматика посвященной тридцатилетию ЧелГУ (г. Челябинск, 2006), Всероссийской научной конференции "Дифференциальные уравнения и их приложения"(г. Самара, 2007), Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения И.Н. Векуа "Дифференциальные уравнения, теория функций и приложения"(г. Новосибирск, 2007), Международной конференции "Дифференциальные уравнения и смежные проблемы"(г. Стерлитамак, 2008), Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения С.Л. Соболева "Дифференциальные уравнения. Функциональные пространства. Теория приближений"(г. Новосибирск, 2008). Также результаты докладывались на семинаре по уравнениям соболевского типа профессора Г. А. Свиридюка в ЮУрГУ (г. Челябинск) и на семинаре чл.-корр. РАН И.А. Шишмарева в МГУ им. М.В. Ломоносова.

**Публикации.** Основные результаты диссертации опубликованы в 10 работах, причем статья [1] – в издании, включенном в перечень ВАК. В работах [1], [10], выполненных в соавторстве с научным руководителем, последнему принадлежит только постановка задачи. Все доказательства выполнены автором диссертации.

**Структура и объем работы.** Диссертация состоит из введения, трех глав и списка литературы. Объем диссертации составляет 123 страницы. Библиография содержит 101 наименование.

### **Краткое содержание диссертации**

**Во введении** обосновывается актуальность темы исследования, определяется цель работы, дается обзор литературы по исследуемой проблематике.

**Первая глава** состоит из семи параграфов и содержит формулировки теорем и определения, которые используются для получения основных результатов диссертации. Первый параграф содержит определения и теоремы об относительно  $p$  - ограниченных операторах. Во втором параграфе вводятся определения решения, фазового пространства, аналитических разрешающих полугрупп и групп операторов, теоремы о существовании аналитических разрешающих полугрупп и групп операторов для линейных уравнений

вида (8), а также определения и теоремы об относительно  $p$ -секториальных операторах. В третьем параграфе содержатся определение решения задачи Шоултера – Сидорова для уравнения (8) и теорема существования и единственности решения обобщенной задачи Шоултера-Сидорова для уравнения (8). В четвертом параграфе рассматриваются определения карты, атласа, банахова  $C^k$ -многообразия, касательного расслоения  $C^k$ -многообразия, векторного поля и теорема Коши. В пятом параграфе определяются пространства Соболева, пространства с негативной и позитивной нормами и приводятся теоремы вложения Соболева и Кондрашова – Реллиха. В шестом параграфе приводятся две теоремы вложения, вводятся определение решения задачи Коши для полулинейного эволюционного уравнения и теорема существования и единственности этого решения. Седьмой параграф содержит определения радиально непрерывного, монотонного, коэрцитивного оператора, теорему Вишика – Минти – Браудера, определение и свойства производной Фреше, теорему о неявной функции, а также определение  $k$ -сборки Уитни.

**Вторая глава** состоит из шести параграфов и посвящена вопросам несуществования и неединственности решения задачи Шоултера – Сидорова для уравнения Корпусова – Плетнера – Свешникова. В **п. 2.1** вводятся понятия решения задачи Коши для уравнения соболевского типа (8), фазового пространства, квазистационарной траектории уравнения (8), проходящей через точку  $u_0$  и доказывается теорема существования и единственности квазистационарной траектории уравнения (8), проходящей через точку  $u_0$ . В **п. 2.2** содержится определение решения задачи Шоултера – Сидорова для уравнения (8), доказаны теоремы существования и единственности задачи Шоултера – Сидорова для уравнения (8) в случае тривиального и нетривиального ядер оператора  $L$ , но простого фазового пространства, а также разобран пример в случае непростого фазового пространства. В **п. 2.3** рассмотрена краевая задача

$$u(a, t) = u(b, t) = 0, t \in \mathbb{R} \quad (10)$$



для уравнения Корпусова – Плетнера – Свешникова

$$\lambda u_t - u_{txx} = \alpha u_{xx} + \beta (uu_x)_x. \quad (11)$$

Чтобы редуцировать задачу (10), (11) к уравнению (8) возьмем пространства  $\mathfrak{U} = \overset{\circ}{W}_2^1$ ,  $\mathfrak{F} = W_2^{-1}$ . Пространство  $\mathfrak{F}$  сопряжено к  $\mathfrak{U}$  относительно скалярного произведения  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  из  $L_2$ . Операторы  $L$  и  $M$  определим формулами

$$\langle Lu, v \rangle = \int_a^b (\lambda uv + u_x v_x) dx, \quad \langle Mu, v \rangle = - \int_a^b \alpha u_x v_x dx,$$

где  $u, v \in \mathfrak{U}$ . По построению операторы  $L, M \in \mathcal{L}(\mathfrak{U}; \mathfrak{F})$  и фредгольмовы.

**Теорема 1** Пусть  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , тогда оператор  $M (L, 0)$ -ограничен.

Обозначим через  $\{\lambda_k\}$  занумерованные по невозрастанию множество собственных значений однородной задачи Дирихле для оператора Лапласа  $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$  на  $(a, b)$ , а через  $\{\varphi_k\}$  — ортонормированное в смысле  $L_2$  множество соответствующих собственных функций. Определим оператор  $N$  формулой

$$\langle N(u), v \rangle = - \int_a^b \beta uu_x v_x dx, \quad u, v \in \mathfrak{U}.$$

**Теорема 2** При любых  $\beta \in \mathbb{R}$  оператор  $N$  принадлежит пространству  $C^\infty(\mathfrak{U}, \mathfrak{F})$ .

В п. 2.4 исследуется морфология фазового пространства уравнения КПС. Построим  $L$ -спектр оператора  $M$

$$\sigma^L(M) = \left\{ \frac{\alpha \lambda_k}{\lambda - \lambda_k} : k \in \mathbb{N} \setminus \{l : \lambda = \lambda_l\} \right\}.$$

Проекторы имеют вид

$$P = \mathbb{I} - \langle \cdot, \varphi_l \rangle \varphi_l, \quad Q = \mathbb{I} - \langle \cdot, \varphi_l \rangle \varphi_l.$$

Построим множество

$$\mathfrak{M} = \{u \in \mathfrak{U} : \langle (Mu + N(u)), \varphi_l \rangle = 0, \lambda = \lambda_l\}$$

и пространства

$$\mathfrak{U}^0 = \ker L = \text{span}\{\varphi_l : \lambda = \lambda_l\}, \mathfrak{U}^1 = \{u \in \mathfrak{U} : \langle u, \varphi_l \rangle = 0, \lambda = \lambda_l\}.$$

Возьмем произвольную точку  $u \in \mathfrak{U}$ , тогда  $u = a\varphi_l + v$ , где  $v = Pu \in \mathfrak{U}^1$ ,  $a \in \mathbb{R}$ . Точка  $u \in \mathfrak{M}$  точно тогда, когда выполнено

$$\frac{a^2}{2} \|\varphi_l\|_{L_3}^3 + a \left( \int_a^b v \varphi_l^2 dx + \frac{\alpha}{\beta} \right) + \frac{1}{2} \int_a^b v^2 \varphi_l dx = 0. \quad (12)$$

Введем в рассмотрение функционал

$$\Delta(v) = \left( \int_a^b v \varphi_l^2 dx + \frac{\alpha}{\beta} \right)^2 - \|\varphi_l\|_{L_3}^3 \int_a^b v^2 \varphi_l dx,$$

$\Delta : \mathfrak{U}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ , и построим множества

$$\mathfrak{U}_+^1 = \{v \in \mathfrak{U}^1 : \Delta(v) > 0\}, \mathfrak{U}_-^1 = \{v \in \mathfrak{U}^1 : \Delta(v) < 0\}.$$

Возьмем точку  $v \in \mathfrak{U}_+^1$ , тогда уравнение (12) имеет два решения

$$\begin{aligned} a_- &= \|\varphi_l\|_{L_3}^{-3} \left( -\frac{\alpha}{\beta} - \int_a^b v \varphi_l^2 dx - \sqrt{\Delta(v)} \right), \\ a_+ &= \|\varphi_l\|_{L_3}^{-3} \left( -\frac{\alpha}{\beta} - \int_a^b v \varphi_l^2 dx + \sqrt{\Delta(v)} \right). \end{aligned} \quad (13)$$

Построим множества

$$\mathfrak{M}_{+(-)} = \{u \in \mathfrak{U} : u = a_{+(-)}(v)\varphi_l + v, v \in \mathfrak{U}_+^1\}.$$

**Теорема 3** Пусть  $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  и

(i)  $\lambda \notin \{\lambda_k\}$ . Тогда фазовым пространством уравнения (8) является все пространство  $\mathfrak{U}$ .

(ii)  $\lambda \in \{\lambda_k\}$ . Тогда фазовым пространством уравнения (8) является множество  $\mathfrak{M}_+ \cup \mathfrak{M}_-$ , каждая компонента которого  $\mathfrak{M}_+$  и  $\mathfrak{M}_-$  биективно проектируется на множество  $\mathfrak{U}_+^1$ .

В п. 2.5 рассматривается задача Шоултера – Сидорова (7) для уравнения (8) и формулируется следующая

**Теорема 4** При любых  $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  и

(i)  $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{\lambda_k\}$  существует ровно одно решение задачи (7), (8) при любых  $u_0 \in \mathfrak{U}$ .

(ii)  $\lambda \in \{\lambda_k\}$  существует два различных решения задачи (7), (8) при любых  $u_0 \in \mathfrak{U}$  таких, что  $Pu_0 \in \mathfrak{U}_+^1$ .

(iii)  $\lambda \in \{\lambda_k\}$  не существует ни одного решения задачи (7), (8) при любых  $u_0 \in \mathfrak{U}$  таких, что  $Pu_0 \in \mathfrak{U}_-^1$ .

**Пункт 2.6** содержит описание программы, разработанной в вычислительной среде Maple 12.0., которая, опираясь на метод Галеркина, позволяет находить приближенное численное решение задачи (1)-(3) и строит графическое изображение этого решения при различных значениях параметров, показывая нетривиальность фазового пространства.




Рис.1 Фазовое пространство задачи (1)-(3) при  $\alpha = 20, \beta = 25, \lambda = -1$ , если  $u(t, x) = u_1(t)\sqrt{2/\pi} \sin x + u_2(t)\sqrt{2/\pi} \sin 2x$

**Третья глава** состоит из пяти параграфов и посвящена вопросу неединственности решения задачи Шоултера-Сидорова для системы уравнений Плотникова. В п.3.1 строятся интерполяционные

пространства, вводятся определения квазистационарной полутраектории уравнения (8), проходящей через точку  $u_0$ , решения задачи Шоултера-Сидорова для уравнения (8), доказывается теорема существования и единственности квазистационарной полутраектории уравнения (8), проходящей через точку  $u_0$  и теорема существования и единственности решения задачи Шоултера-Сидорова для уравнения (8). Также здесь построены два примера, один в случае простого фазового пространства, в другом – фазовое пространство представляет собой сборку Уитни. В **п.3.2** рассмотрена система уравнений Плотникова

$$v_t = v_{xx} - w_{xx}, \quad 0 = v + w_{xx} + \delta w - \beta w^3 \quad (14)$$

с краевыми условиями вида

$$(u_x - \lambda u)(a, t) = (u_x + \lambda u)(b, t) = 0, \quad t \in \mathbb{R}_+, \quad (15)$$

где  $u = \text{col}(v, w)$ ,  $v = v(x, t)$ ,  $w = w(x, t)$ ,  $(x, t) \in (a, b) \times \mathbb{R}_+$ , параметры  $\lambda, \delta \in \mathbb{R}_+, \beta \in \mathbb{R}$ . Чтобы редуцировать задачу (14), (15) к уравнению (8) положим  $\mathfrak{U} = (L_2)^2$ . Пространство  $\mathfrak{U}$  – гильбертово со скалярным произведением  $[u, \zeta] = \int_a^b v \xi dx + \int_a^b w \eta dx = (v, \xi) + (w, \eta)$ , где  $\zeta = \text{col}(\xi, \eta)$ , а через  $(\cdot, \cdot)$  обозначено скалярное произведение в  $L_2$ . Пусть  $\mathfrak{F}$  пространство сопряженное к  $\mathfrak{U}$  относительно двойственности  $[\cdot, \cdot]$ . Операторы  $L$  и  $M$  зададим формулами

$$[Lu, \zeta] = \int_a^b v \xi dx, \quad u, \zeta \in \mathfrak{U};$$

$$[Mu, \zeta] = - \int_a^b v_x \xi_x dx - \lambda (v(a) \xi(a) + v(b) \xi(b)) + \int_a^b w_x \xi_x dx +$$

$$\lambda (w(a) \xi(a) + w(b) \xi(b)) - \int_a^b w_x \eta_x dx - \lambda (w(a) \eta(a) + w(b) \eta(b)),$$

$$u, \zeta \in \mathfrak{U}_M, \quad \text{dom } M = \mathfrak{U}_M = (W_2^1)^2.$$

**Теорема 5** *Оператор  $M$  сильно  $(L, 0)$  - секториален.*

Построим оператор

$$[N(u), \zeta] = \int_a^b (v + \delta w - \beta w^3) \eta dx$$

и положим  $\text{dom } N = (L_4)^2 = \mathfrak{U}_N$ . В силу теорем вложения Соболева справедлива следующая

**Теорема 6** *При любых  $\beta, \delta \in \mathbb{R}$  оператор  $N \in C^\infty(\mathfrak{U}_N; \mathfrak{F})$ .*

Построим пространства  $\mathfrak{U}^\alpha$ . Получим, что при  $\alpha \in (1/2, 1]$  пространства  $\mathfrak{U}^\alpha \hookrightarrow L_\infty$ . Положим  $\mathfrak{U}_1^0 = \mathfrak{U}^0 \cap \mathfrak{U}_M = \{0\} \times W_2^1$  и возьмем  $\mathfrak{U}_\alpha = \mathfrak{U}_1^0 \oplus \mathfrak{U}_\alpha^1$ , где  $\mathfrak{U}_\alpha^1 = \mathfrak{U}^\alpha \times \{0\}$ .

**Следствие 1** *При любых  $\beta, \delta \in \mathbb{R}$  оператор  $N \in C^\infty(\mathfrak{U}_\alpha; \mathfrak{F})$ .*

Построим множество

$$\mathfrak{M} = \left\{ u \in \mathfrak{U}_\alpha : \int_a^b v \eta dx = \int_a^b (w_x \eta_x - \delta w \eta + \beta w^3 \eta) dx + \right. \\ \left. + \lambda(w(a)\eta(a) + w(b)\eta(b)) \right\}.$$

Введем в рассмотрение пространства  $\mathfrak{W}_M = \mathfrak{W}_M = W_2^1$ , так что теперь  $\mathfrak{U}_M = \mathfrak{W}_M \times \mathfrak{W}_M$ . Обозначим через  $\{\nu_k\}$  занумерованные по неубыванию с учетом кратности собственные значения следующей спектральной задачи:

$$\begin{aligned} -\varphi_{xx} &= \nu \varphi, \quad x \in (a, b), \\ \varphi_x(a) &= \lambda \varphi(a), \quad \varphi_x(b) = -\lambda \varphi(b). \end{aligned} \tag{16}$$

Обозначим через  $\{\varphi_k\}$  соответствующие собственные функции, ортонормированные в смысле скалярного произведения  $(\cdot, \cdot)$  из  $L_2$ .

**Теорема 7** Пусть  $\beta, \lambda \in \mathbb{R}_+$ ,  $\delta \in (0, \nu_1)$ , где  $\nu_1$  – первое собственное значение спектральной задачи (16),  $\alpha \in (1/2, 1)$ . Тогда фазовым пространством уравнения (7) служит простое банахово  $C^\infty$  - многообразие  $\mathfrak{M}$ .

**Теорема 8** Пусть выполнены условия теоремы 7. Тогда для любого  $u_0 \in \mathfrak{U}_\alpha$  существует единственное решение задачи (4)-(6).

Теперь рассмотрим случай, когда  $\delta = \nu_1$ . В данном случае множество  $\mathfrak{M}$  определяется системой из двух уравнений

$$\begin{cases} \int_a^b v^\perp \eta^\perp dx = \int_a^b (w_x^\perp \eta_x^\perp - \nu_1 w^\perp \eta^\perp + \beta(w^\perp + s\varphi)^3 \eta^\perp) dx + \\ + \lambda(w^\perp(a)\eta^\perp(a) + w^\perp(b)\eta^\perp(b)), & (17) \\ \beta^{-1}r = \int_a^b (w^\perp + s\varphi)^3 \varphi dx. & (18) \end{cases}$$

Здесь числа  $s, r \in \mathbb{R}$ , а  $\varphi$  – собственная функция задачи (16), отвечающая собственному значению  $\nu_1$  и нормированная в смысле  $L_2$ ; векторы  $v^\perp \in \mathfrak{U}^{\perp\perp}$ ,  $w^\perp, \eta^\perp \in \mathfrak{W}_M^\perp$ , где  $\mathfrak{U}^{\perp\perp} = \{v \in \mathfrak{U} : (v, \varphi) = 0\}$ ,  $\mathfrak{W}_M^\perp = \{w \in \mathfrak{W}_M : (w, \varphi) = 0\}$ .

**Лемма 1** При любых  $\beta, \lambda \in \mathbb{R}_+$ ,  $s \in \mathbb{R}$  и  $v^\perp \in \mathfrak{U}^{\perp\perp}$  существует единственное решение  $w \in \mathfrak{W}_M^\perp$  уравнения (17).

Теперь перейдем к уравнению (18). Как хорошо известно из формул Кардано, уравнение (18) имеет от одного до трех действительных корней, причем оно имеет ровно два действительных корня, если вдобавок к нему выполняется уравнение

$$R(s, w^\perp) = s^2 \|\varphi\|_{L_4}^4 + 2s \int_a^b \varphi^3 w^\perp dx + s \int_a^b \varphi^2 (w^\perp)^2 = 0.$$

Введем в рассмотрение следующие множества:

$$\mathfrak{W}_M^0 = \{w \in \mathfrak{W}_M : R(s, w^\perp) = 0\},$$

$$\mathfrak{W}_M^+ = \{w \in \mathfrak{W}_M : R(s, w^\perp) > 0\}, \quad \mathfrak{W}_M^- = \{w \in \mathfrak{W}_M : R(s, w^\perp) < 0\}.$$

**Лемма 2** При любых  $\beta, \lambda \in \mathbb{R}_+$ ,  $r \in \mathbb{R}$  и  $v^\perp \in \mathfrak{U}^{\alpha^\perp}$  существует решение  $(w^\perp, s) \in \mathfrak{W}_M^\perp \times \mathbb{R}$  системы уравнений (17), (18).

Введем в рассмотрение вспомогательный оператор

$$(B(w^\perp + s\varphi), \eta^\perp + t\varphi) = \int_a^b (w_x^\perp \eta_x^\perp - \nu_1 w^\perp \eta^\perp + \beta(w^\perp + s\varphi)^3 \eta^\perp) dx + \\ + \lambda(w^\perp(a)\eta^\perp(a) + w^\perp(b)\eta^\perp(b)) + t \int_a^b (w^\perp + s\varphi)^3 \varphi dx.$$

Оператор  $B : \mathfrak{W}_M \rightarrow \mathfrak{H}$  коэрцитивен, монотонен, радиально непрерывен.  $\mathfrak{H}$  – пространство, сопряженное к  $\mathfrak{W}_M$  относительно двойственности  $(\cdot, \cdot)$ . Обозначим  $\mathfrak{H}^- = B[\mathfrak{W}_M^-]$ ,  $\mathfrak{H}^\circ = B[\mathfrak{W}_M^\circ]$ ,  $\mathfrak{H}^+ = B[\mathfrak{W}_M^+]$ .

Рассмотрим множество  $\mathfrak{F} = \{u \in \mathfrak{M} : R(s, w^\perp) \neq 0\}$ .

**Теорема 9** При любых  $\beta, \lambda \in \mathbb{R}_+$  множество  $\mathfrak{F}$  является фазовым пространством задачи (17), (18).

**Теорема 10** При любых  $\beta, \lambda \in \mathbb{R}_+$  и  $u_0 \in \mathfrak{U}^\alpha$  такого, что

- (i)  $v_0 \in \mathfrak{U}^\alpha \cap \mathfrak{H}^-$  существует точно одно решение задачи (4)-(6);
- (ii)  $v_0 \in \mathfrak{U}^\alpha \cap \mathfrak{H}^+$  существует точно три решения задачи (4)-(6).

**П.3.5** содержит описание программы, разработанной в вычислительной среде Maple 12.0., которая, опираясь на метод Галеркина, позволяет находить приближенное численное решение задачи (4)-(6) и строит графическое изображение этого решения при различных значениях параметров, показывая нетривиальность фазового пространства.




Рис.2 Проекция фазового пространства задачи (4)-(6) при  $\lambda = 1$ ,  $\delta = 1$ ,  $\beta = 1$ , если

$$v(t, x) = v_1(t) \sqrt{\frac{2}{\pi(\lambda^2+1)}} (\lambda \sin(x) + \cos(x)) + v_2(t) \sqrt{\frac{8}{\pi(\lambda^2+4)}} \left(\frac{\lambda}{2} \sin(x) + \cos(x)\right),$$

$$w(t, x) = w_1(t) \sqrt{\frac{2}{\pi(\lambda^2+1)}} (\lambda \sin(x) + \cos(x)) + w_2(t) \sqrt{\frac{8}{\pi(\lambda^2+4)}} \left(\frac{\lambda}{2} \sin(x) + \cos(x)\right).$$

### Результаты, выносимые на защиту:

1. Исследована морфология фазового пространства уравнения Корпусова – Плетнера – Свешникова.

2. Найдены достаточные условия, когда задача Шоултера – Сидорова для уравнения Корпусова – Плетнера – Свешникова имеет ровно одно, ровно два различных и не имеет решений.

3. Построен алгоритм численного решения задачи Шоултера – Сидорова для уравнения Корпусова – Плетнера – Свешникова при различных значениях параметров и получено графическое изображение этого решения.

4. Исследована морфология фазового пространства системы уравнений Плотникова.



5. Найдены достаточные условия, когда задача Шоултера – Сидорова для системы уравнений Плотникова имеет ровно одно и ровно три различных решения.

6. Построен алгоритм численного решения задачи Шоултера – Сидорова для системы уравнений Плотникова при различных значениях параметров и получено графическое изображение этого решения.

### **Публикации автора по теме диссертации**

*Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК:*

1. Карамова, А. Ф. (Гильмутдинова А. Ф.) О складке фазового пространства одного неклассического уравнения / Г. А. Свиридюк, А. Ф. Карамова (А. Ф. Гильмутдинова) // Дифференц. уравнения. – 2005. – Т. 41, № 10. – С. 1400-1405.

*Другие научные публикации:*

2. Карамова, А. Ф. (Гильмутдинова А. Ф.) Складка фазового пространства уравнения двухкомпонентной полупроводниковой плазмы / А. Ф. Карамова // Современные методы теории функций и смежные проблемы: тез. докл. науч. конф. – Воронеж: ВГУ, 2005. – С. 110.

3. Карамова, А. Ф. (Гильмутдинова А. Ф.) О складке фазового пространства уравнения Корпусова-Плетнера-Свешникова / А. Ф. Карамова // Студент и научно-техн. прогресс: тез. докл. науч. студ. конф. – Челябинск: ЧелГУ, 2005. – С. 6.

4. Гильмутдинова А. Ф. О простоте фазового пространства системы уравнений Кагиналла / А. Ф. Гильмутдинова // Вестн. МаГУ. Математика. – Магнитогорск: МаГУ, 2006. – С. 5-16.

5. Гильмутдинова А. Ф. Фазовое пространство системы уравнений Кагиналла / А. Ф. Гильмутдинова // Дифференциальные уравнения и их приложения: тез. докл. науч. конф. – Самара: "Универс групп 2007. – С. 39.

6. *Гильмутдинова А. Ф.* Об особенностях фазового пространства системы уравнений Кана-Хилларда / А. Ф. Гильмутдинова // Дифференциальные уравнения, теория функций и их приложения: тез. докл. междунар. конф., Новосибирск, 28 мая-2 июня 2007 г.– Новосибирск: НГУ, 2007.– С. 111.

7. *Гильмутдинова А. Ф.* О неединственности решений задачи Шоултера-Сидорова для одной модели Плотникова / А. Ф. Гильмутдинова // Вестн. СамГУ. – 2007.–№ 9/1.– С. 85-90.

8. *Гильмутдинова А. Ф.* О феномене неединственности задачи Шоултера-Сидорова для полулинейных уравнений соболевского типа / А. Ф. Гильмутдинова // Дифференциальные уравнения и смежные проблемы: тр. междунар. конф., Стерлитамак, 24-28 июня 2008 г.– Уфа: Гилем, 2008.–Т.1.– С. 61-64.

9. *Гильмутдинова А. Ф.* О неединственности задачи Шоултера-Сидорова для полулинейных уравнений соболевского типа / А. Ф. Гильмутдинова // Дифференциальные уравнения. Функциональные пространства. Теория приближений: тез. докл. междунар. конф., Новосибирск, 5-12 октября 2008 г.– Новосибирск: НГУ, 2008.–С. 122.

10. *Гильмутдинова А. Ф.* Неединственность решений системы уравнений Кагиналпа. / Г. А. Свиридюк, А. Ф. Гильмутдинова // Математика. Механика. Информатика: тез. докл. Всерос. научной конф., Челябинск, 19-22 сентября 2006 г.– Челябинск: ЧелГУ, 2006.– С. 28.

Гильмутдинова Альбина Фаритовна

ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
С ФЕНОМЕНОМ НЕЕДИНСТВЕННОСТИ

05.13.18 – математическое моделирование,  
численные методы и комплексы программ

АВТОРЕФЕРАТ

диссертация на соискание ученой степени  
кандидата физико-математических наук

Издательство Южно-Уральского государственного университета

---

Подписано в печать 26.12.08. Формат 60 × 84 1/16.

Печать трафаретная. Усл. печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 1.

Тираж 100 экз. Заказ 420/486.

---

Отпечатано в типографии Издательства ЮУрГУ.

454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76

